

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLR 8-7-70 074639

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

~~ICANNADOS~~, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, ~~MANCHE~~, MORBIHAN, ~~ORNE~~

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

ANNEXE AU BULLETIN N° 118

7 Juillet 1970

AVERTISSEMENTS

POMMIER - POIRIER

Carpocapse : L'importance des pontes observées nécessite de renouveler - dès que possible - la protection à l'égard de ce parasite.

Tavelure : L'adjonction d'un fongicide à la bouillie destinée à combattre le carpocapse ne se justifie que dans les seuls vergers où la présence de taches de tavelure, même en nombre limité, peut laisser craindre un nouveau départ de l'affection, si des conditions climatiques favorables à son développement se réalisaient.

POMME DE TERRE

Mildiou : Une attaque importante du Mildiou, signalée ces jours derniers en diverses régions de Bretagne (Nord, Sud et Centre Finistère, région de PONTIVY, notamment), nous amène à préconiser l'exécution d'un nouveau traitement, dès réception de cet avis, sur les cultures de pommes de terre de consommation devant être récoltées après le 20 Juillet ainsi que sur celles de semences dont la destruction des fanes doit intervenir postérieurement à cette même date.

Rappelons que dès que dans une parcelle les attaques du Mildiou présentent un caractère généralisé et épidémique, le meilleur moyen d'assurer la protection des tubercules consiste à procéder sans tarder à la destruction des fanes.

Doryphore : Dans le cas où l'on est appelé à effectuer un traitement contre le Mildiou, s'assurer au préalable - par une visite attentive des cultures - si par suite de la présence de larves de doryphore, il n'y a pas lieu d'ajouter un insecticide à la bouillie fongicide.

Défanage de la pomme de terre : De nombreuses observations ont permis de constater que des accidents se produisaient sur les tubercules récoltés après un défanage chimique (brunissement de l'anneau vasculaire). Ces nécroses peuvent entraîner des refus à l'exportation aussi bien pour les pommes de terre de semence que de consommation.

Afin d'éviter ces inconvénients il y a lieu de traiter lorsque la terre est encore humide en profondeur, quelques jours après une pluie par exemple.

Pour les cultures de semence, où la date d'intervention est impérative, on opérera de préférence à la tombée de la nuit pour limiter les dégâts.

Note : Tous les produits, mal appliqués, peuvent provoquer ces nécroses.

TOMATE

Mildiou : Dans les zones où cette affection apparaît assez tôt, plus particulièrement dans les régions attaquées par le Mildiou de la pomme de terre, renouveler le traitement conseillé par l'avis du 25 Juin ou le faire sans tarder s'il n'a pas encore été exécuté.

L'Ingénieur d'Agronomie,

A. CRESPIY.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

J. DELOUSTAL.